

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 75/KN-KTNN

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2021

V/v tiếp tục chăm sóc và phòng trừ rầy nâu
bảo vệ lúa vụ xuân năm 2021

Kính gửi:

- Các Trạm Khuyến nông huyện và liên quận
- Các Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm.

Theo tổng hợp tiến độ sản xuất đến ngày 20/5/2020, diện tích lúa đã trở cơ bản xong, các trà lúa đang trong giai đoạn vào giai đoạn chắc xanh-đỏ đuôi-chín, có diện tích chuẩn bị cho thu hoạch, lúa sinh trưởng phát triển tốt, ước diện tích lúa gặt đến 25/05/2020 là 2.500 ha. Thời tiết, những ngày qua có mưa giông xen kẽ nắng nóng liên tục nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi cho rầy nâu phát triển, mật độ nơi cao từ 750-1500 con/m², cá biệt đã có điểm mật độ trên 3.000 con/m², tại các xã Hữu Bằng, Tân Trào, Minh Tân huyện Kiến Thụy, Phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh,...

Dự báo trong thời gian tới, rầy nâu lúa 3 tiếp tục nở rộ, mật độ ổ trứng và rầy non sẽ tiếp tục tăng mật độ và gây hại trên các trà lúa, một số nơi có nguy cơ gây “cháy rầy” nếu không được điều tra phát hiện, phun trừ kịp thời, đúng kỹ thuật sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ xuân. Giám đốc Trung tâm yêu cầu các Trạm, Phòng chuyên môn tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương điều tiết, giữ mực nước trên đồng ruộng hợp lý giai đoạn lúa từ trở - chín đỏ đuôi.

2. Tăng cường cán bộ khuyến nông bán sát cơ sở, điều tra phát hiện sớm, khoanh vùng những diện tích nhiễm rầy có mật độ rầy từ 1.500 con/m² hướng dẫn phun trừ kịp thời, hiệu quả.

- Đối với những diện tích lúa đang giai đoạn ngâm sữa - chắc xanh - chín sáp nên sử dụng các loại thuốc tiếp xúc như: Cheestar 50WG, Chersieu 50WG, Oshin 20WP, Penalty 40WP, Apta 300WP, Chatot 600WG, Lobby 25WP,....

- Đối với diện tích lúa đang trong giai đoạn phơi màu - vào chắc sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Chess 50 WG, Oshin 20 WP....

- Khi phun phải rẽ lúa thành băng, mỗi băng từ 5 - 6 hàng lúa, giữ mực nước ruộng 2 - 3 cm và phải phun vào phần thân, gốc lúa để thuốc tiếp xúc trực

tiếp với rầy. Sau khi phun thuốc 3 - 4 ngày cần phải kiểm tra lại, nếu mật độ còn cao, nhất thiết phải phun lại lần hai mới đạt yêu cầu.

Chú ý: Liều lượng pha và phun đủ lượng nước, thuốc theo hướng dẫn trên bao bì của từng loại thuốc. Khi phun rầy ruộng cần đưa nước vào ruộng 3-5cm, sau phun thuốc 3 - 4 giờ gặp mưa phải phun lại để đảm bảo hiệu quả.

Đối với những diện tích đến kỳ thu hoạch kiểm tra nếu mật độ rầy cao tiến hành “gặt chạy” rầy, tránh lãng phí thuốc, ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo, ô nhiễm môi trường; đồng thời áp dụng phương châm “xanh nhà còn hơn già đồng” nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

3. Đối với diện tích nhiễm khô vẫn có thể phun kết hợp với một trong số loại thuốc Anvil 5SC, Chenvin 5SC, Help 400SC,...

4. Đề nghị các Phòng chuyên môn, các Trạm Khuyến nông chỉ đạo cán bộ kỹ thuật tập trung cao cho công tác điều tra, phát hiện, hướng dẫn phòng trừ rầy nâu lúa 3 từ nay đến cuối vụ, kịp thời hiệu quả, tăng cường viết tin bài thông báo, cho đài phát thanh các huyện, quận, địa phương, kịp thời. Tham mưu cho các lãnh đạo địa phương có giải pháp kỹ thuật kịp thời, hiệu quả nhằm bảo vệ năng suất lúa vụ Xuân 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp & PTNT (để báo cáo);
- GD, các Phó GD TT;
- Phòng KTNN, ĐT TTTT, TVKN, HCTC;
- Công thông tin điện tử Trung tâm;
- Lưu: VT, KTNN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Cao Thanh Huyền